

Heidenhain 铁苏木素染色液说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

苏木素(Hematoxylin)和伊红(Eosin)联合染色简称 HE 染色，是病理学和组织学最常用的一种染色方法。苏木精为碱性天然染料，可使细胞核着色，细胞核内染色质的主要成分是 DNA，在 DNA 的双螺旋结构中，两条核苷酸链上的磷酸基向外，使 DNA 双螺旋的外侧带负电荷，呈酸性，很容易与带正电荷的苏木精碱性染料以离子键或氢键结合而被染色。

Heidenhain 铁苏木素染色液以硫酸铁铵作为氧化剂和分化剂，根据不同的分化程度可显示不同的结构，染色后所有成分均为黑色或深灰黑色，不同组织结构的苏木素着色可被 Heidenhain 分化液以不同的速度进行性褪去，黑色褪去顺序依次为：线粒体、横纹肌、核染色质。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

染色原理：

1、细胞核染色原理：苏木素为碱性天然染料，可使细胞核着色，细胞核内染色质的成分主要是 DNA，在 DNA 双螺旋结构中两条核苷酸链上的磷酸基向外，使 DNA 双螺旋的外侧带负电荷，呈酸性，很容易与带正电荷的苏木素碱性染料以离子键或氢键结合而被染色，苏木素在碱性溶液中呈蓝色，所以细胞核被染成蓝色。

2、细胞浆染色原理：伊红是一种化学合成的酸性染料，在一定条件下可使细胞浆着色，细胞浆的主要成分是蛋白质，为两性化合物，细胞浆的染色与染液的 pH 值密切相关，当染色液 pH 值在胞浆蛋白质等电点(4.7~5.0)以下时，胞浆蛋白质以碱式电离，则细胞浆带正电荷，就可被带负电荷的酸性染料染色。伊红在水中离解成带负电荷的阴离子，与胞浆蛋白质带正电荷的阳离子结合，使细胞浆着色，呈现红色。

3、分化作用：染色后，用某些特定的溶液将组织过多结合的染色剂脱去，这个过程称为分化作用，所用的溶液称为分化液，HE 染色中常用 0.5~1%盐酸乙醇作为分化液。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
Heidenhain 铁苏木素染色液	4×100ml	RT	1 份	2 年

操作步骤(仅供参考):

1、切片脱蜡至水

- ①二甲苯或浸蜡脱蜡透明液作用 2 次, 每次 5~10min。
- ②(可选)无水乙醇作用 2 次, 每次 3~5min。
- ③95%乙醇 3~5min
- ④90%乙醇 3~5min
- ⑤80%乙醇 3~5min
- ⑥自来水或蒸馏水(亦可用 30~40℃温水)冲洗 1~3min

2、染色

- ①Heidenhain Differentiation 媒染 1h (见注意事项 1) ②自来水或蒸馏水冲洗 5~10s ③Heidenhain 铁苏木素染色液染色 1h ④自来水冲洗 20~30s ⑤(可选步骤)伊红染色 2~4min ⑥Heidenhain Differentiation 分化或用蒸馏水 1:1 稀释 Heidenhain Differentiation 分化, 并与自来水冲洗交替进行, 显微镜下观察分化程度(见注意事项 2)。

⑦自来水冲洗	10min
3、脱水、透明、封固	
①80%乙醇	10~20s
②90%乙醇	10~20s

- ③95%乙醇作用 2 次, 每次 1~2min。
- ④无水乙醇作用 2 次, 每次 2~3min。
- ⑤二甲苯或浸蜡脱蜡透明液透明 3 次, 每次 2~3min。
- ⑥中性树脂封片。

染色结果: 线粒体、横纹肌、髓磷脂、染色质等呈灰黑色。

注意事项:

- 1、Heidenhain Differentiation 媒染时间和 Heidenhain 铁苏木素染色液染色时间根据不同的固定液而异; 一般情况下媒染和染色时间控制在 1h 即可, 参考时间为: 福尔马林、Bouin 固定液、Carnoy 固定液 1h, Helly、Zenker 等重铬酸盐固定液 3h, 四氧化锇、Flemming 固定液 24h。
- 2、显微镜下控制分化程度, 直到出现所需观察的结构; 若分化过度, 可用苏木素重染相同时间并重新分化; 亦可用蒸馏水 2:1 稀释 Heidenhain Differentiation 后再进行分化, 以便更好控制分化程度。
- 3、切片分化后应彻底冲洗洗掉所有分化液, 组织不易褪色。
- 4、胞浆复染(伊红或橙黄 G)可突出核染色质, 尤其在显示染色体或有丝分裂更有效, 本试剂提供了伊红复染液, 但不是必需步骤。
- 5、切片脱蜡应尽量干净。
- 6、系列乙醇应经常更换新液。
- 7、冷冻切片染色时间尽量要短。

8、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

酸性乙醇分化液(0.5%)
苏木素伊红(HE)染色液（水溶）
苏木素伊红(HE)染色液（醇溶）
苏木素无水乙醇溶液(5%)
苏木素无水乙醇溶液(10%)
改良 Lillie-Mayer 苏木素染色
改良 Lillie-Mayer 苏木素染色
改良 Harris 苏木素染色液

