

## 无机磷检测试剂盒(紫外分光光度微板法)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

血清中的无机磷(Inorganicphosphorous)主要由  $H_2PO_4^-$  和  $HPO_4^{2-}$  两种磷酸根阴离子组成，上述阴离子在不同的 pH 环境下能快速相互转换，在 pH7.4 血清中两种磷酸根阴离子浓度比例为 1:4；在酸中毒环境下二者浓度约为 1:1；在碱中毒环境下二者浓度比例为 1:9；在 pH4.5 尿液中浓度比例为 100:1。WHO 推荐的常规检测方法为比色法，我国卫生部临检中心推荐的常规方法为硫酸亚铁钼蓝比色法和米吐尔钼蓝比色法，亦可采用紫外分光光度法。

无机磷检测试剂盒(紫外分光光度微板法)无需处理样本，利用无机磷与钼酸铵结合生成磷钼酸铵，通过酶标仪直接检测 325~340nm 处吸光度，根据公式计算出无机磷含量。紫外分光光度法优点在于：操作简单、快速、稳定；缺点在于：易受溶血、黄疸、脂血的干扰。该试剂盒仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成：

名称	规格	保存条件
无机磷检测试剂盒(紫外分光光度微板法)	100T	4℃
试剂(A):磷标准(1mg/ml)	1ml	4℃
试剂(B):磷标准稀释液	2ml	RT
试剂(C):PiAssayBuffer	10ml	RT
试剂(D):钼酸铵显色液	10ml	4℃避光
试剂(E):ddH <sub>2</sub> O	2ml	RT
使用说明书	1 份	
有效期	1 年	

### 自备材料：

- 1、离心管或试管
- 2、离心机
- 3、比色杯
- 4、分光光度计

### 操作步骤(仅供参考)：

1、(选做)制备样品:

- ①血浆、血清样品: 血浆、血清按照常规方法制备, 可以直接用于本试剂盒的测定, -20℃冻存, 用于 Pi 的检测。
- ②细胞或组织样品: 取恰当细胞或组织进行匀浆, 低速离心取上清, -20℃冻存, 用于 Pi 的检测。
- ③高浓度样品: 如果样品中含有较高浓度的 Pi, 可以使用 ddH<sub>2</sub>O 稀释, 不宜使用普通蒸馏水稀释。
- ④(选做)样品准备完毕后可以用 BCA 蛋白浓度测定试剂盒测定蛋白浓度, 以便于后续计算单位蛋白重量组织或细胞内的 Pi 含量。

2、制备磷标准工作液: 取适量的磷标准(1mg/ml), 按磷标准(1mg/ml): 磷标准稀释液=1:24 的比例稀释, 即获得磷标准(1.292mmol/L), 4℃保存, 用于 Pi 的检测。

3、制备 Pi 显色工作液: 取适量的 PiAssayBuffer 和钼酸铵显色液, 等量混合即为 Pi 显色工作液, 最好 24h 内使用。

4、Pi 加样: 按照下表设置空白孔、标准孔、测定孔, 溶液应按照顺序依次加入, 并注意避免产生气泡, 小心混匀。如果样品中的无机磷浓度过高, 可以减少样品用量或适当稀释后再进行测定, 样品的检测最好能设置 2 平行孔, 求平均值。

加入物(μl)	空白管	标准管	测定管
ddH <sub>2</sub> O	7	—	—
磷标准工作液(1.292mmol/L)	—	7	—
待测样品	—	—	7
Pi 显色工作液	200	200	200

5、Pi 测定: 混匀, 37℃孵育 10min, 以空白调零, 酶标仪 340nm 处测定, 读取标准孔、测定孔的吸光度(即为 A 标准, A 测定)。

计算:

血清、血浆中无机磷计算公式: 磷(mmol/L)=(A 测定/A 标准)×1.292 尿液中无机磷计算公式: 磷(mmol/d)=(A 测定/A 标准)×1.292×N×24h 尿量(L)组织中磷计算公式: 磷(mmol/mg)=(A 测定/A 标准)×1.292/待测样品蛋白浓度(mg/L)式中: A 测定=测定管的吸光度 A 标准=标准管的吸光度 N=尿液稀释倍数单位换算: mg/dl=mmol/L/0.323

参考区间: 健康成年人血清磷浓度: 0.9~1.34mmol/L(2.76~4.16mg/dl)

注意事项:

- 1、本法应在 5min~2h 内检测, 3h 后标准管吸光度无变化, 测定管吸光度随着时间的延长而上升。

- 2、溶血样本对检测有干扰，尽量避免采用溶血样本。
- 3、黄疸和脂血样本应做标本空白。
- 4、本法能够用于自动生化分析仪终点检测法。
- 5、如果样品浓度过高，应用蒸馏水稀释后重测，结果乘以稀释倍数
- 6、本法线性范围为 0.33~3.88mmol/L。

**相关产品：**

维生素 C 检测试剂盒(磷钼酸微板法)
维生素 C 检测试剂盒(磷钼酸比色法)
维生素 C 检测试剂盒(菲咯啉微板法)
维生素 C 检测试剂盒(菲咯啉比色法)
维生素 C 检测试剂盒(碘量滴定法)
维生素 B2 检测试剂盒(荧光光度法)
维生素 B1 检测试剂盒(荧光光度法)
脱氢抗坏血酸(DHA)检测试剂盒(菲咯啉微板法)
脱氢抗坏血酸(DHA)检测试剂盒(菲咯啉比色法)