

## Acr-Bis(37.5%: 1%)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介:

丙烯酸胺:亚甲基双丙烯酸胺溶液又称 Acr-Bis，最常用的是 30%Acr-Bis(29:1)即为含 30% Acrylamide-Bisacrylamide 的水溶液，其中 Acrylamide 和 Bisacrylamide 的比例为 29:1，丙烯酸胺的总比例为 30%。

Acr-Bis(37.5%: 1%)中 Acrylamide 和 Bisacrylamide 的比例为 37.5:1，丙烯酸胺总量为 38.5%，常用于配制丙烯酸胺凝胶(PAGE 胶)，如 SDS-PAGE 胶等，可以用于蛋白或核酸的分离。

### 产品组成:

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
Acr-Bis(37.5%: 1%)	500ml	4℃ 避光	1 份	6 个月

### 操作步骤(仅供参考):

1、因具体实验而异，可以参考 SDS-PAGE 凝胶配制的说明。

### 注意事项:

- 1、Acr-Bis(37.5%:1%)对人体有一定神经毒性，请注意适当防护。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品:

Acr-Bis (40%, 49_1)
Acr-Bis (40%_2%)
Acr-Bis (45%, 43.4_1.6)
Acr-Bis 粉剂 (40%, 19_1)
Ammonium+persulfate (APS)